

KetogardTM Vet Bolus

Ketoprofen BP 400 mg

Compositions

Each bolus contains ketoprofen BP 400 mg.

Indication

Ketogard vet bolus (ketoprofen) is indicated for-

Cattle

- Treatment of lameness of traumatic origin, features, tendonitis etc.
- Management of post-surgical pain, relieving chronic pain (e.g., arthritis etc.) and for the symptomatic treatment of fever (e.g. ephemerical fever, FMD etc.).
- Reducing pyrexia and distress associated with bacterial respiratory disease when used in conjunction with antimicrobial therapy.
- Reducing oedema of the udder associated with calving.
- Improving the recovery rate in acute clinical mastitis, including acute endotoxin mastitis, caused by gram negative bacteria in conjunction with antimicrobial therapy.
- Supportive treatment of parturient paresis (Milk Fever) associated with calving.

Horse

- Alleviation of inflammation and pain associated with musculoskeletal disorders.
- Alleviation of visceral pain associated with colic.

Dosage and administration

Cattle: 1 bolus per 100 kg body weight (4 mg/kg) orally daily for upto 3 days.

Or, As directed by the veterinary physician.

Contraindication

- Do not administer to cattle or horses hypersensitive to ketoprofen.
- Do not administer other non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs) concurrently or within 24 hours each other.
- Contraindicated in animals suffering from cardiac, hepatic or renal disease, gastro-intestinal ulceration or bleeding and where there is evidence of a blood dyscrasia.

Special Warnings

- Administration in animals aged less than 6 weeks or in aged animals may involve additional risk. In such case, if treatment is needed, may require a reduce dosage and careful management.
- Avoid use in any dehydrated, hypovolaemic or hypotensive animals as there is a potential risk of increased renal toxicity.

Side Effect

Like all NSAIDs, gastric or renal intolerance may occur in certain individuals.

Use during pregnancy and lactation

Ketogard vet Bolus may be given to pregnant and lactation cow. Ketogard vet Bolus should not be administered to pregnant mares.

Drug Interaction

Concurrent administration with nephrotoxic drugs should be avoided.

For Veterinary Use only

Withdrawal period

Meat: 4 days

Milk: Nil

Storage

Store in cool and dry place, protected from light.

Keep all medicines out of reach of children.

Supply

10x2's bolus in a box.

Manufactured by:
Guardian Healthcare Ltd.
Vet Life Division
Ashulia, Dhaka, Bangladesh

কিটোগার্ডTM ভেট বোলাস

কিটোপ্রোফেন বিপি ৪০০ মি.গ্রা.

উপাদান

প্রতিটি বোলাসে আছে কিটোপ্রোফেন বিপি ৪০০ মি.গ্রা.

নির্দেশনা

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কিটোগার্ড ভেট বোলাস (কিটোপ্রোফেন) নির্দেশিত -

গরু

- আঘাতজনিত খোঁড়ানো, হাড়ভাঙ্গা, টেন্ডনাইটিস ইত্যাদির চিকিৎসায় নির্দেশিত।
- অস্ত্রোপচার পরবর্তী ব্যথা ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা (আর্থ্রাইটিস) প্রশমনে এবং এফিমেরাল ফিভার, ফুরারোগ ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট জ্বরের চিকিৎসায়।
- জ্বর প্রশমন ও ব্যাকটেরিয়াজনিত শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহে এন্টিবায়োটিকের সাথে সহযোগী চিকিৎসা হিসাবে।
- প্রসবজনিত ওলান ফেবার চিকিৎসায়।
- গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংঘটিত তীব্র এন্ডোটক্সিন ম্যাস্টাইটিস সহ তীব্র ক্লিনিক্যাল ম্যাস্টাইটিস-এ দ্রুত আরোগ্য লাভে এন্টিবায়োটিকের সাথে ব্যবহার।
- পাস্চুরিয়েন্ট পেরেসিস (মিল্ক ফিভার) এর সহযোগী চিকিৎসা হিসাবে।

ঘোড়া

- পেশী - কঙ্কালতন্ত্রের অস্বাভাবিকতায় সৃষ্ট ব্যথা ও প্রদাহ।
- কলিক/পেট ব্যথার চিকিৎসায়।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি

গরু- প্রতিদিন ১ টি বোলাস/ ১০০ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য (৪ মি.গ্রা./কেজি) মুখে ৩ দিন খাওয়ানো হবে।

অথবা, ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার।

প্রতিনির্দেশনা

- কিটোপ্রোফেনের প্রতি সংবেদনশীল প্রাপিতে।
- কিটোপ্রোফেনের সাথে বা কিটোপ্রোফেন ব্যবহারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্য কোন নন-স্টেরয়ডাল এন্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগের ব্যবহার প্রতিনির্দেশিত।
- বৃক্ক, যকৃত ও হৃদরোগের ক্ষেত্রে পরিপাকতন্ত্রের আলসার বা রক্তপাত বা ব্লাড ডিসক্রসিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার অনুচিত।

বিশেষ সতর্কতা

- ৬ সপ্তাহের কম বা বয়স্ক প্রাপিতে কিটোপ্রোফেন ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ। একান্ত প্রয়োজনে মাত্রা কমিয়ে সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।
- ডিহাইড্রেটেড, হাইপোভলিমিক বা হাইপোটেনসিভ প্রাণির বৃক্কীয় বিষক্রিয়ার ঝুঁকি থাকায় এসব প্রাপিতে কিটোপ্রোফেন ব্যবহার অনুচিত।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া

অন্যান্য নন-স্টেরয়ডাল এন্টি-ইনফ্ল্যামেটরি ঔষধের ন্যায় কিটোগার্ড বোলাস (কিটোপ্রোফেন) এর ব্যবহার কোন কোন প্রাণির পরিপাক বা বৃক্কের জন্য অসহনশীল হতে পারে।

গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী প্রাপিতে ব্যবহার

কিটোগার্ড ভেট বোলাস গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী গাভীতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে গর্ভবতী ঘোটকীতে ব্যবহার অনুচিত।

অন্যান্য ঔষধের সাথে ক্রিয়া

কিটোগার্ড ভেট বোলাস (কিটোপ্রোফেন) এর সাথে বৃক্কের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এমন কোন ঔষধ (নোস্ট্রোস্টিক) ব্যবহার না করা ভাল।

প্রত্যাহার কাল

মাংস : ৪ দিন

দুধ : ৪ নাই

সংরক্ষণ

আলো থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখুন।
সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন।

গুণমাত্রা প্রাপি চিকিৎসায় ব্যবহার

সরবরাহ

প্রতিটি বক্সে ১০x২ টি বোলাস



প্রস্তুতকারক:-

গার্ডিয়ান হেলথকেয়ার লিঃ

ভেট লাইফ ডিভিশন

আশুলিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ