

**Composition:**

Each bolus contains Metronidazole BP 2 g.

**Indication:****Animals:**

Metritis, endometritis, vaginitis, trichomoniasis, giardiasis, balantidiasis, gingivitis, amoebic dysentery and calf scour. Post operative treatment after colonic surgery and inflammatory bowel disease.

**Poultry:**

Histomoniasis, giardiasis, trichomoniasis etc.

**Dosage and Administration:****Animals:**

Orally: 40-50 mg/kg body weight.

(i.e., 1 bolus per 40-50 kg body weight) for 5-7 days.

**Intra-uterine:**

4 bolus directly or as powder from per 100 kg body weight.

**Poultry:**

1 bolus / 3-6 liter drinking water for 4-6 days.

Or as directed by the veterinary physician.

**Contraindication:**

Animals hypersensitive to metronidazole.

It should be avoided in pregnant animals, especially in the first trimester and it should not be used in lactating animals.

**Side effect:**

Usually salivation, vomiting, decreased appetit. Gastro-intestinal upset etc may occur.

**Storage:**

Store in a cool and dry place, protected from light.

Keep all medicines out of reach of children

**For Veterinary Use Only****Supply:**

Each box contains 10x2 bolus.



Manufactured by:  
**Guardian Healthcare Ltd.**  
Vet Life Division  
Nikkon Housing, Amtola, Zirabo  
Ashulia, Dhaka, Bangladesh.

**উপাদান:**

প্রতিটি বোলাসে আছে মেট্রোনিডাজল বি.পি. ২ গ্রাম।

**নির্দেশনা:**

প্রাণির ক্ষেত্রে :

মেট্রোইটিস, এন্ডোমেট্রাইটিস, ভ্যাজাইনাইটিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস, জিয়ারডিয়াসিস, ব্যালাস্টিডিয়াসিস, ম্যাড্র প্রদাহ, অ্যামিবা দ্বারা সৃষ্ট আমাশয় এবং আন্ত্রিক প্রদাহের চিকিৎসায়।

হাঁস-মুরগির ক্ষেত্রে :

হিস্টোমোনিয়াসিস, জিয়ারডিয়াসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস ইত্যাদি।

**মাত্রা ও প্রয়োগবিধি:**

প্রাণিরক্ষেত্রে :

মুখে : ৪০-৫০ মি.গ্রা. প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য অর্থাৎ (১ টি বোলাস ৪০-৫০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য) ৫-৭ দিন খাওয়াতে হবে।

জরায়ুতে : প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৪টি বোলাস সরাসরি অথবা পাউডার করে জরায়ুতে প্রবেশ করাতে হবে।

হাঁস-মুরগির ক্ষেত্রে :

১ টি বোলাস ৩-৬ লিটার খাবার পানির সাথে মিশিয়ে ৪-৬ দিন খাওয়াতে হবে। অথবা ভেটেরিনারি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

**প্রতিনির্দেশনা:**

মেট্রোনিডাজল এর প্রতি অতিসংবেদনশীল প্রাণিদের ক্ষেত্রে প্রতিনির্দেশিত।

গর্ভাবস্থায়, বিশেষ করে গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস এবং দুধ দেওয়া প্রাণিদের ক্ষেত্রে মেট্রোগার্ড বোলাস ব্যবহার করা উচিত নয়।

**পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:**

সাধারণত লালানরা, বমি বমি ভাব, খাদ্যে অরুচি, পাকস্থলীর গভোগোল ইত্যাদি হতে পারে।

**সংরক্ষণ:**

আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন।

সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

**শুধুমাত্র প্রাণি চিকিৎসায় ব্যবহার্য****সরবরাহ :**

প্রতি বাক্সে ১০x২ টি বোলাস।



প্রস্তুতকারক:-  
**গার্ডিয়ান হেলথকেয়ার লিঃ**  
নিক্কন হাউজিং, আমতলা, জিরাবো  
আশুলিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।