

# Strimgard vet

Sulfadiazine + Trimethoprim

## Composition:

Each 100 ml suspension contains  
Sulfadiazine BP 40 g  
Trimethoprim BP 8 g

## Indications:

**Strimgard** vet suspension is used for the prevention and treatment of different infections caused by different Gram (+) and Gram (-) bacteria, mycoplasma etc. In poultry such as salmonellosis or pullorum disease, colibacillosis, fowl typhoid, pastorellosis or fowl cholera, gastro-enteritis, chronic respiratory disease (CRD), actinobacillosis actinomycosis, coccidiosis, infectious polyarthritis, toxoplasmosis etc. Strimgard suspension is also used when the antibiotic and other chemotherapeutic agents are not effective due to development of resistance of microorganisms.

## Dosage & Administration:

**Strimgard** vet suspension should be used daily with drinking water. At first required dose of Strimgard vet suspension should be mixed with little quantity of water which is then mixed with total quantity of water for easily dissolution.

### Poultry:

Treatment: 1 ml Strimgard vet suspension with 5 liters of drinking water daily for 4-6 days. (The minimum dose is 15 mg per kg body weight daily)

Prevention: 1 ml Strimgard vet suspension with 10 liters of drinking water daily for 2-3 days

or as directed by the Registered Veterinary physicians.

## Contraindications:

**Strimgard** vet suspension is contraindicated in animals with known hypersensitivity to active ingredients. Meat of broiler & Egg of Layer birds, which are treated with Strimgard vet suspension should not be consumed within 5 days after treatment.

## Precautions:

Meat of broiler & Egg of Layer birds, which are treated with Strimgard Vet suspension should not be consumed within 5 days after treatment

## Side effects:

At the recommended dose, side effects are rare and mild. Sometimes hematological reaction and skin rashes may occur.

## Storage Conditions:

Store in a cool and dry place, protected from light and moisture. Keep all medicines out of the reach of children.

## For Veterinary Use Only

### Supply:

100 ml,  
500 ml  
1 liter



Manufactured by :  
**Guardian Healthcare Ltd.**  
Vet Life Division  
Amtola, Zirabo, Ashulia  
Dhaka, Bangladesh.

# স্ট্রিমগার্ড ভেট

সালফাডায়াজিন + ট্রাইমেথোপ্রিম

## উপাদান:

প্রতি ১০০ মি.লি. সাসপেনশনে আছে  
সালফাডায়াজিন বি.পি. ৪০ গ্রাম  
ট্রাইমেথোপ্রিম বি.পি. ৮ গ্রাম

## নির্দেশনা:

স্ট্রিমগার্ড-ভেট সাসপেনশন পোস্তিতে বিভিন্ন গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, মাইকোপ্লাজমা ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন সংক্রমণ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়, যেমন-সালমোনেলোসিস বা পুলোরাম রোগ কলিবেসিলোসিস, ফাউল টাইফয়েড, ফাউল কলেরা বা প্যাষ্টেরেলোসিস, গ্যাট্রোএন্টারাইটিস, ক্রনিক রেসপিরেটরী ডিজিজ (সি.আর.ডি) এন্ট্রিনোমাইকোসিস, এন্ট্রিনোবেসিলোসিস, কল্ডিওসিস, ইনফেকশাস পলিআর্থ্রাইটিস, টরেলোপ্লাজমসিস ইত্যাদি। যখন এন্টিবায়োটিক ও অন্যান্য কেমোথেরাপিউটিক এজেন্ট এর প্রতি জীবানু রেজিস্ট্যান্স হওয়ার কারণে কাজ করে না তখন স্ট্রিমগার্ড-ভেট সাসপেনশন ব্যবহার করা যায়।

## মাত্রা ও প্রয়োগবিধি :

স্ট্রিমগার্ড-ভেট সাসপেনশন প্রতিদিন বিশুদ্ধ খাবার পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। প্রথমে প্রয়োজনীয় মাত্রায় ঔষধ সামান্য পরিমাণ পানিতে মিশিয়ে পরে তা সম্পূর্ণ পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

চিকিৎসায়: দৈনিক ১ মি.লি. সাসপেনশন ৫ লিটার খাবার পানির সাথে মিশিয়ে ৪-৬ দিন খাওয়াতে হবে।

প্রতিরোধে: ১ মি.লি. সাসপেনশন ১০ লিটার খাবার পানির সাথে মিশিয়ে ২-৩ দিন খাওয়াতে হবে।

## অথবা রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার

## প্রতিনির্দেশনা :

সক্রিয় উপাদানসমূহের প্রতি অতি সংবেদনশীল প্রাণিতে ব্যবহার করা যাবে না।

## সাবধানতা:

স্ট্রিমগার্ড-ভেট সাসপেনশন দ্বারা সর্বশেষ চিকিৎসার ৫ দিন পর্যন্ত ব্রয়লারের মাংস ও লেয়ার মুরগীর ডিম মানুষের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

## পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া:

স্ট্রিমগার্ড-ভেট সাসপেনশন নির্দেশিত মাত্রায় ব্যবহারে সাধারণত কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। তবে দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে হেমাটোলজিক্যাল পরিবর্তন দেখা দিতে পারে।

## সংরক্ষণ:

আলো থেকে দূরে, শুষ্ক ও ঠান্ডা (৩০° সেং তাপমাত্রার নীচে) স্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন। ঔষধ ব্যবহারের পূর্বে বোতল ভালোভাবে ঝাঁকিয়ে নিন।

## ঔষুমাত্র প্রাণি চিকিৎসায় ব্যবহার

### সরবরাহ:

১০০ মি.লি.  
৫০০ মি.লি.  
১ লিটার



প্রস্তুতকারক  
**গার্ডিয়ান হেলথকেয়ার লিঃ**  
ভেট লাইফ ডিভিশন  
আমতলা, জিরাবো, আশুলিয়া  
ঢাকা, বাংলাদেশ